Repérer la dépression périnatale

Sarah Tebeka
Sarah.tebeka@aphp.fr

20.09.22

Epidémiologie

- Décompensation d'un trouble préexistant
- Episode inaugural (aigu ou chronique)

Grossesse : une période protégée ?

Moins de troubles
psychiatriques graves

Moins
d'hospitalisations

Grossesse : une période protégée ?

Moins de troubles
psychiatriques graves

Moins
d'hospitalisations

Symptômes psychiatriques
fréquents

Arrêt de traitements : risque de
décompensations

Début des troubles : évolueront
dans le post-partum

Grossesse : une période protégée ?

→ **Moment privilégié d'intervention précoce**

Prévalence

Prévalence : 10 et 20 %

Grande variabilité

Ko, 2012 – Shorey, 2018 – Underwood, 2016 – Woody, 2017

Grossesse

Début précoce (6-8 semaines)

Début tardif (2-12 Mois)

Norhayati, 2015 – Woody, 2017

Kothari, 2016 – Wikman, 2019

PACT Consortium, 2015 – The International Marce Society, 2015

Sémiologie

Sémiologie

Facteurs de vulnérabilité

Santé physique

- Obésité, HTA
- Complications obstétricales

Psycho-sociaux

- Isolement / manque de support
- Traumatismes (infantiles, conjugaux, en cours de grossesse)
- Evènements de vie stressant

Dépression périnatale

Génétique

Facteurs génétiques et épigénétiques

Histoire psychiatrique

- Troubles de l'humeur
- Troubles anxieux
- Antécédents périnataux
- Histoire familiale

Conséquences

LA MÈRE

- Risque suicidaire X 6
- Récurrence : ~ 50 %
Vie entière
Périnatale
- Troubles dépressifs et bipolaires

Orsolini, 2016 - Howard, 2020
Johannsen, 2020

GROSSESSE

- Moindre suivi de grossesse
- FCS
- Complications obstétricales
- Prématurité et hypotrophie

Allister, 2001 – Dieter, 2001 -
Emory & Dieter, 2006

LE BEBE

- Troubles du développement social cognitif et émotionnel
- Troubles psychiatriques à l'adolescence et à l'âge adulte

Netsi, 2018 - van der Waerden ,
2015, 2017 - Slomian, 2019 (revue)

➔ **Problème de santé publique**

Sous-diagnostic

BANALISATION

Symptômes « classiques » de la période périnatale (asthénie, trouble du sommeil ...)

CULPABILITE

Peur de la
STIGMATISATION

Manque d'INFORMATION

- Des femmes
- De leur entourage
- Des soignants

Pas de diagnostic

>50% pendant la grossesse
>1/3 en post-partum

- **Travail en réseau**
- **A chaque temps de la grossesse**
 - ❖ **Entretien anténatal précoce**
 - ❖ **Entretien postnatal précoce**

Stratégies de prévention

1. J'ai pu rire et prendre les choses du bon côté.

Aussi souvent que d'habitude

Pas tout à fait autant

Vraiment beaucoup moins souvent ces jours-ci

Absolument pas

2. Je me suis sentie confiante et joyeuse en pensant à l'avenir.

Autant que d'habitude

Plutôt moins que d'habitude

Vraiment moins que d'habitude

Pratiquement pas

3. Je me suis reprochée, sans raison, d'être responsable quand les choses allaient mal*.

Oui, la plupart du temps

Oui, parfois

Pas très souvent

Non, jamais

4. Je me suis sentie inquiète ou soucieuse sans motifs.

Non, pas du tout

Presque jamais

Oui, parfois

Oui, très souvent

5. Je me suis sentie effrayée ou paniquée sans vraiment de raisons*.

Oui, vraiment souvent

Oui, parfois

Non, pas très souvent

Non, pas du tout

6. J'ai eu tendance à me sentir dépassée par les événements*.

Oui, la plupart du temps, je me suis sentie incapable de faire face aux situations

Oui, parfois, je ne me suis pas sentie aussi capable de faire face que d'habitude

Non, j'ai pu faire face à la plupart des situations

Non, je me suis sentie aussi efficace que d'habitude

7. Je me suis sentie si malheureuse que j'ai eu des problèmes de sommeil*.

Oui, la plupart du temps

Oui, parfois

Pas très souvent

Non, pas du tout

8. Je me suis sentie triste ou peu heureuse*.

Oui, la plupart du temps

Oui, très souvent

Pas très souvent

Non, pas du tout

9. Je me suis sentie si malheureuse que j'en ai pleuré*.

Oui, la plupart du temps

Oui, très souvent

Seulement de temps en temps

Non, jamais

10. Il m'est arrivé de penser à me faire du mal*.

Oui, très souvent

Parfois

Presque jamais

Jamais

- Auto questionnaire
- Rapide: 10 questions
- Echelle fiable et validée
- Bien accepté par les patientes et les cliniciens

Stratégies de prévention

EPDS

1. J'ai pu rire et prendre les choses du bon côté.

Aussi souvent que d'habitude

Pas tout à fait autant

Vraiment beaucoup moins souvent ces jours-ci

Absolument pas

2. Je me suis sentie confiante et joyeuse en pensant à l'avenir.

Autant que d'habitude

Plutôt moins que d'habitude

Vraiment moins que d'habitude

Pratiquement pas

3. Je me suis reprochée, sans raison, d'être responsable quand les choses allaient mal*.

Oui, la plupart du temps

Oui, parfois

Pas très souvent

Non, jamais

4. Je me suis sentie inquiète ou soucieuse sans motifs.

Non, pas du tout

Presque jamais

Oui, parfois

Oui, très souvent

5. Je me suis sentie effrayée ou paniquée sans vraiment de raisons*.

Oui, vraiment souvent

Oui, parfois

Non, pas très souvent

Non, pas du tout

6. J'ai eu tendance à me sentir dépassée par les événements*.

Oui, la plupart du temps, je me suis sentie incapable de faire face aux situations

Oui, parfois, je ne me suis pas sentie aussi capable de faire face que d'habitude

Non, j'ai pu faire face à la plupart des situations

Non, je me suis sentie aussi efficace que d'habitude

7. Je me suis sentie si malheureuse que j'ai eu des problèmes de sommeil*.

Oui, la plupart du temps

Oui, parfois

Pas très souvent

Non, pas du tout

8. Je me suis sentie triste ou peu heureuse*.

Oui, la plupart du temps

Oui, très souvent

Pas très souvent

Non, pas du tout

9. Je me suis sentie si malheureuse que j'en ai pleuré*.

Oui, la plupart du temps

Oui, très souvent

Seulement de temps en temps

Non, jamais

10. Il m'est arrivé de penser à me faire du mal*.

Oui, très souvent

Parfois

Presque jamais

Jamais

« Au cours de la dernière semaine ... »

Stratégies de prévention

Dépistage systématique en suite de couche de la dépression périnatale

Ce score ne se substitue pas à l'évaluation clinique réalisée quotidiennement pas les sages-femmes. De plus, ne pas oublier que les psychologues continuent à assurer des consultations en chambre sur de nombreuses autres indications.

Donner le questionnaire EPDS avec le « kit d'entrée »

Le récupérer dans la même journée et calculer le score

Si refus de la patiente
➢ Lien PMI ++
➢ Noter dans le CRH « Patiente dépister à risque de dépression du post-partum. N'a pas souhaité d'évaluation au cours de son séjour à la maternité »

Coordonnées à donner aux patientes :

- Equipe de psychiatrie de liaison : 06 33 62 47 85 / sarah.tebeka@aphp.fr
- Psychologues de maternité :
 - Astrid : 01.47.60.61.64 / astrid.brunswick@aphp.fr
 - Lydie : 01.47.60.68.58 / lydie.lopez@aphp.fr
- SF libérale : liste SF SDC à donner
- PMI

Lors de votre séjour en maternité vous avez répondu à un questionnaire de dépistage systématique de la dépression périnatale. Si au retour à la maison vous en ressentez le besoin, voici les coordonnées de l'équipe de psychologues et psychiatres de la maternité

EPDS
En suite de couche
à Louis Mourier

Stratégies de prévention

N = 5383 femmes

dont 4547 femmes (soit **84,5%**) ayant fait l'EPDS du 01/05/2020 au 31/12/2021

Stratégies de prévention

N = 5383 femmes

dont 4547 femmes (soit **84,5%**) ayant fait l'EPDS du 01/05/2020 au 31/12/2021

Stratégies de prévention

EPDS
En suite de couche
à Louis Mourier

N=3604 femmes

dont 2977 femmes (soit **82.6%**)
ayant fait l'EPDS
du 01/05/2020 au 30/04/2021

PREVIDEPP

**INCLUSION
10-24 SA**

EPDS

VS

Soins habituels

**Randomisation
des sages-femmes**

PREVIDEPP

Critères d'inclusion

- ✓ Femmes majeure (âgées > 18 ans)
- ✓ Entre 10 et 24 semaines de grossesse
- ✓ Maîtrise du français écrit et parlé (peut comprendre un auto-questionnaire);
- ✓ Affilié à un régime de sécurité sociale

Critères d'exclusion

- ≠ Diagnostic rapporté de schizophrénie ou état physique et intellectuel incompatible avec une évaluation clinique
- ≠ Personnes incapables de donner leur consentement
- ≠ Personnes sous protection (tutelle ou tutelle)
- ≠ Patiente sous AME (aide médicale d'État)

PREVIDEPP

PREVIDEPP

4471 femmes

=> 23 inclusions / site / mois

PREVIDEPP

En l'absence de visite, les femmes peuvent être appelées pendant les deux premières semaines post-partum pour bénéficier de l'entretien téléphonique. En cas de non-réponse, l'évaluation de la dépression pendant la grossesse peut être faite lors de la deuxième visite de suivi.

4471 femmes

=> 23 inclusions / site / mois

Repérer la dépression périnatale

Sarah Tebeka
Sarah.tebeka@aphp.fr

20.09.22